



DESARROLLO TÉCNICO

Junio, 2018

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida agrícola			
NOMBRE COMERCIAL: PROPERTY® 300 SC			
FORMULACION: Suspensión concentrada	pH DE LA FORMULACIÓN: 7.2	COLOR: Blanco	SOLUBILIDAD EN AGUA: Misible.
COMPOSICIÓN PORCENTUAL:		PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:	
Ingredientes activos		Pyriofenone	
Pyriofenone (5-cloro-2-metoxi-4-metil-3-piridil) (4,5,6-trimetoxi-o-tolil) Metanona 27.30 (Equivalente a 300 g de i.a./Litro a 20°C)		FAMILIA QUIMICA: Benzoylpyridina	
Ingredientes inertes		FORMULA QUIMICA: C ₁₈ H ₂₀ CINO ₅	
Agentes dispersantes, agentes de suspensión, anticongelante, antiespumante, coadyuvante, preservativo y diluyente (agua)..... 72.70 Total..... 100.00			
MODO DE ACCION: PROPERTY® 300 SC es un fungicida tiene acción preventiva y curativa con penetración sistémica, actúa ejerciendo alta presión de vapor, lo que potencia su eficacia. Excelente alternativa para manejo de resistencia.			
CATEGORÍA DE PELIGRO: 4 Precaución	RESIDUALIDAD: Moderada	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0355-X0098-064-27.30	
USOS AUTORIZADOS: Es un fungicida con propiedades protectoras que actúa preventivamente contra la cenicilla y provee control curativo de la enfermedad. PROPERTY 300 SC está formulado como suspensión concentrada para el control de la enfermedad y en el cultivo.			
Cultivos	Enfermedad	Dosis ml/ha	Recomendaciones
Calabacita, Calabaza, Pepino, Melón, Sandía (0)	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	333	Realice 2 aplicaciones foliares con intervalo de 7 días. Inicie el tratamiento cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad y/o se manifiesten los primeros síntomas.
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora (0)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis</i>)		Realice 2 aplicaciones foliares con intervalo de 7 días. Inicie el tratamiento cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad y/o se manifiesten los primeros síntomas. Se recomienda el uso de un coadyuvante organosiliconado no iónico, a razón de 0.025%.
Vid (0)	Cenicilla (<i>Erysiphe necator</i>)		Realice 2 aplicaciones foliares con intervalo de 7 días. Inicie el tratamiento cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad y/o se manifiesten los primeros síntomas.
Cultivos en condiciones de agricultura protegida	Enfermedad	Dosis ml/ha	Recomendaciones
Rosal (0)	Cenicilla del rosal (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	333	Inicie las aplicaciones de forma preventiva cuando las condiciones climáticas sean favorables para el inicio de la enfermedad y/o se detecten los primeros síntomas. Realice 3 aplicaciones a intervalo de 7 días. Utilice la dosis baja en condiciones de baja presión de la enfermedad y la dosis alta en condiciones de mayor presión.
(0) Intervalo de Seguridad			
Tiempo de reentrada: 12 horas después de la aplicación del producto.			
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Contenido de 333 ml Envase de 1.0 L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No.2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00	