

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS

TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida agrícola			
NOMBRE COMERCIAL: PENTACLOR® 600 F			
FORMULACIÓN: Suspensión acuosa	pH DE LA FORMULACIÓN: 6.0 a 8.0	COLOR: Blanco	SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible
COMPOSICIÓN PORCENTUAL:		PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:	
% EN PESO		Quintozeno	
Ingrediente activo		FAMILIA QUIMICA:	
Quintozeno		Clorobenceno	
Pentacloro nitro benceno 46.3		FORMULA QUIMICA:	
(Equivalente a 600 g de i.a./l a 20° C)		C ₂ CL ₃ NO ₂	
Ingredientes inertes			
Coadyuvante de molienda, humectante, viscosante, dispersante y diluyente (agua) 53.7			
Total: 100.0			
MODO DE ACCIÓN: Al igual que una gran cantidad de compuestos no relacionados que poseen anillo aromático, el Pentaclor® 600 F es toxico para microorganismos por la inhibición de la producción de compuestos con grupos NH ₂ y SH, esto es, aminoácidos y enzimas.			

CATEGORÍA DE PELIGRO: 5 Precaución	RESIDUALIDAD: Moderadamente	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0335-023-008-046
--	---------------------------------------	--

USOS AUTORIZADOS:

Cultivos	Enfermedades	Dosis Litros/ha	Recomendaciones
Algodonero	Secadera (<i>Rhizoctonia solani</i>) Damping off (<i>Thielaviopsis sp</i>)	4 a 7	Asperje en bandas al momento de la siembra.
Cacahuete	Pudrición (<i>Sclerotium rolfsii</i>) Secadera (<i>Rhizoctonia solani</i>)	12 a 14	Aplique en bandas de 60 cm al momento de la siembra cubriendo simultáneamente el suelo y la semilla antes de tapar.
Chile Jitomate (tomate) Tomate de cascara	Marchitez (<i>Sclerotium rolfsii</i>) Secadera (<i>Rhizoctonia solani</i>)	12 a 15	Aplique en bandas o mateado al momento del transplante.
Frijol	Pudrición (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Secadera (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2 a 3	Aplique en bandas de 25 cm sobre el suelo que cubrirá la semilla. No se aplique sobre la semilla.
Pastos	Secadera (<i>Rhizoctonia solani</i>) Mancha café (<i>Fusarium sp</i>) Mancha foliar (<i>Helminthosporium spp</i>)	12 a 20	En aspersión total use la dosis alta para pastos San Agustín y Bermuda, dé un riego pesado inmediatamente.
Papa	Roña o Escama (<i>Streptomyces scabies</i>) Secadera (<i>Rhizoctonia solani</i>)	12 a 20	Aplique en bandas de 30 cm al momento de la siembra cubriendo simultáneamente el suelo y la semilla antes de tapar.
Viveros: frutales y forestales	Pudrición de raíz (<i>Fusarium sp</i>) Secadera (<i>Rhizoctonia solani</i>)	8 a 17	Asperje y revuelva bien con la tierra antes de la siembra o transplante.

Tiempo de reentrada: 48 horas después de la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 1 L Cubeta de 18 L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.
---	---	--