

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
TIPO DE AGROINSUMO: Insecticida agrícola			
NOMBRE COMERCIAL: Alentador®			
FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable	pH DE LA FORMULACIÓN: ND	COLOR: Amarillo pálido	SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: Ingrediente activo: Lambda cihalotrina (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilcilopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilcilopropanocarboxilato..... 7.8151 (Equivalente a 70 g i.a./L) Ingrediente inerte Solvente y emulsificantes 92.1849 Total: 100.0000		PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: Lambda cihalotrina FAMILIA QUIMICA: Piretroides FORMULA QUIMICA: C ₂₃ H ₁₉ ClF ₃ NO ₃	
MODO DE ACCIÓN: Alentador® es un insecticida piretroide de acción por contacto e ingestión, con efecto de choque y persistencia..			
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 3 Peligro	RESIDUALIDAD: Alta	REGISTRO OFICIAL: RSCO-INAC-0177-X0191-009-7.81	
USOS AUTORIZADOS:			
Cultivos	Plagas	Dosis (litros/ha)	Recomendaciones
Algodonero (21)	Pulga saltona (<i>Pseudaletia unipuncta</i>)	0.5 a 0.7	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días, agregue a la mezcla un coadyuvante a razón de 0.05%, volumen de aplicación 950 a 1,050 litros de agua/ha.
Maíz, Sorgo (15)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.2 a 0.3	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Jitomate (5)	Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>)	0.3 a 0.6	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Berenjena, Jitomate (5) Papa (10)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.35 a 0.5	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor (1)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.4 a 0.6	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalos de 15 días.
Soya (15)	Gusano terciopelo (<i>Anticarsia persea</i>)	0.35 a 0.6	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Aguacatero (14)	Mosquita blanca (<i>Paraleyrodes persea</i>) Minador (<i>Gracilaria persea</i>)	0.4 a 0.6	Realice 2 aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días.
() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha Tiempo de reentrada: 6 horas después de aplicar el producto.			
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso	PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 200 mL Envase de 1 L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.	