



HERBICIDA PRE Y POST EMERGENTE
PARA EL CULTIVO DE MAÍZ

Orion[®]
Herbicida

Amicarbazone 700 gr de i.a / kg

- **Mejor control por más tiempo.**
- **Excelente control de malezas de hoja ancha difíciles.**
- **Excelente relación Costo-Beneficio, mostrando mayor días control a un menor costo.**





¿QUÉ ES ORION?

Herbicida Pre emergente y post emergente temprano, selectivo en el cultivo de maíz, controla un amplio rango de malezas de hoja ancha difíciles y control parcial de zacates. Puede ser aplicado sobre suelo seco o húmedo con una residualidad prolongada.

ORION controla hojas anchas y zacates en condiciones de suelo seco y húmedo con una residualidad prolongada.



PARA UN MEJOR DESEMPEÑO:

Aplique la dosis baja de ORION en suelos medianos y dosis alta en suelos arcillosos o de alto contenido de materia orgánica.

PRE EMERGENCIA:

Es altamente recomendable mezclar ORION con PROPONIT (Propisoclor) así:
 300 gr ORION + 2.5 l PROPONIT
 500 gr ORION + 2.0 l PROPONIT

POST EMERGENCIA TEMPRANA:

(Estrictamente solo en aplicaciones dirigidas entre hileras)
 Para obtener un control total del complejo de malezas mezclar Orion 200gr + 1 litro de Templador (Paraquat) o Glufosinato de amonio.

NOTA IMPORTANTE:

No aplicar ORION en maíces amarillos o criollos.

CULTIVOS	MALEZA	DOSIS kg/ ha	RECOMENDACIONES
Maíz	Flor amarilla (<i>Melampodium arvense</i>) Lechosilla (<i>Euphorbia maculata</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Correhuela (<i>Ipomoea purpurea</i>) Chayotillo (<i>Sicyos angulata</i>)	0.3 - 0.5	Aplicar: En pre emergencia total al cultivo y a la maleza así: 300 gr ORION + 2.5 l PROPONIT 500 gr ORION + 2.0 l PROPONIT En post emergencia temprana: (Estrictamente solo en aplicaciones dirigidas entre hileras) Orion 200gr + 1 l de Templador (Paraquat) Para obtener un control total del complejo de malezas hojas anchas y hojas angostas mezclar con PROPISOCLOR O TEMPLADOR respectivamente. Puede utilizarse PHASE como acondicionador de pH.

Tiempo de reentrada a áreas tratadas: 12 horas después de aplicado.

ONM-04-17