



Terraguard[®] 480 SC


Fungicida

Triflumizole

Fungicida – Concentrado Soluble

A la Cenicilla le pone fin

- Rápido, eficaz y contundente.
- Duro contra la cenicilla y suave con la planta.
- Suprime de modo importante la incidencia de otras enfermedades como Botrytis y Alternaria, entre otros.
- NO deja residuos, ni en los pétalos de una rosa.



pronutiva[®]
Programa Arysta de Protección + Biosoluciones



Modo de acción

Terraguard® 480 SC es un fungicida preventivo, curativo y erradicante, en novedosa formulación lo que lo convierte en avanzada tecnología para el control de cenizas en diversos cultivos.


Acción sistémica con rápida absorción, incluso en tejidos suculentos.



Acción preventiva: inhibe la germinación de las esporas del hongo evitando el establecimiento de la enfermedad en tejidos sanos.

Acción curativa: penetra a los tejidos internos de la hoja para eliminar el hongo e impedir daños en los tejidos infectados.

Acción erradicante: elimina la esporulación del hongo lo que evita nuevas infecciones.



Recomendaciones de uso

Terraguard® 480 SC es un producto de fácil uso y dosificación para uso en los cultivos abajo especificados

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS l/ha	RECOMENDACIONES
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía (0)	Ceniza de las cucurbitáceas (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	0.50 a 0.70	Realice hasta 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Utilizando un volumen de agua de 500 l/ha en cada aplicación.
Fresa (0)	Ceniza (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.50 a 0.60	Realice hasta 3 aplicaciones a intervalos de 7 días según se mantengan las condiciones ambientales y al desarrollo de la enfermedad. Utilizando un volumen de agua de 400 l/ha en cada aplicación.
Manzano (14)	Ceniza del manzano (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0.50 a 0.70	Realice hasta 3 aplicaciones a intervalos de 14 días. Utilizando un volumen de agua de 1200 l/ha en cada aplicación.
Piña (0)	Pudrición Negra (<i>Ceratocystis paradoxa</i> = <i>Chalara paradoxa</i>)	0.50 a 0.60	Realice 3 aplicaciones a intervalos de 30 días. La primera aplicación dirigida al suelo previo a la plantación; la segunda y tercera aplicación dirigida al follaje. Debe aplicarse con equipo convencional, procurando una buena cobertura al suelo y al follaje, utilizando un volumen de agua de 400 l/ha en cada aplicación.
Vid (7)	Ceniza de la vid (<i>Uncinula necator</i>)	0.60 a 0.70	La dosis por ha puede variar dependiendo de la cantidad de agua que se requiera usar según altura y follaje del cultivo. Utilizando un volumen de agua de 850 l/ha en cada aplicación.

Obtenga los mejores resultados

- Aplique a la aparición de los primeros síntomas.
- En variedades susceptibles a cenizas y condiciones de alta presión, considere una segunda aplicación 4 a 7 días después de la primera.
- Adicione surfactante Silwet® L77 o Silwet® Maxx a la mezcla.
- Asegure buena cobertura durante la aplicación.

Terraguard® 480 SC tiene tolerancias en los principales cultivos.

Producto	LMR
Acelga	18
Amaranto	35
Berro	35
Brócoli	8
Calabaza	0.5
Cereza	1.5
Chayote	0.5
Coles	40

Producto	LMR
Coliflor	8
Espinaca	35
Fresa	2
Lechuga	35
Limón	0.5
Maíz, elote	35
Mango	2.5
Manzano	0.5

Producto	LMR
Melón	0.5
Papaya	2.5
Pepino	0.5
Pera	0.5
Perejil	35
Piña	4
Sandía	0.5
Vid	2.5

Compatibilidad

Terraguard® 480 SC es compatible con la mayoría de productos en el mercado incluyendo cobres, azufres y fertilizantes foliares



Bld. Jesús Valdés Sánchez #2369
 Fracc. Europa, C.P. 25290
 Saltillo, Coahuila, México
 Tel.: +52 (844) 438-0500